

MEDICAMENTS COURAMMENT UTILISES ET EFFETS INDESIRABLES

Cet outil reprend prioritairement les effets secondaires fréquents pouvant être repérés par un infirmier. Il ne s'agit pas de listes exhaustives.

ANTAGONISTES CALCIIQUES	Exemples de médicaments - Amlodipine (Amlor®) 1 - Nifédipine (Adalat®) 2 - Vérapamil (Isoptine®) 3 - Diltiazem (Tildiem®) 4	Effets indésirables fréquents - Œdème membres inférieurs 1,2,3,4 - Constipation 3,4 - Bradycardie 3,4 - Hypotension 1,2,3,4
INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IECA)	- Captopril (Capoten®) - Lisinopril (Zestril®) - Périndopril (Coversyl®) - Ramipril (Tritace®)	- Toux sèche - Hypotension
STATINES	- Atorvastatine (Lipitor®) - Pravastatine (Praveduct®) - Rosuvastatine (Crestor®) - Simvastatine (Zocor®)	- Douleurs musculaires
BETA BLOQUANTS	- Atenolol (Tenormin®) - Bisoprolol (Emconcor®) - Carvedilol (Kredex®) - Nebivolol (Nobiten®)	- Hypotension - Bradycardie - Fatigue
ANTICOAGULANTS	- Acenocoumarol (Sintrom®) - Phenprocoumone (Marcoumar®) - Warfarine (Marevan®) - Apixaban (Eliquis®) - Dabigatran (Pradaxa®) - Rivaroxaban (Xarelto®) - Enoxaparine (Clexane®) - Nadroparine (Fraxiparine®)	- Hématomes - Sang dans les selles et les urines - Saignements anormaux ou abondants (exemple : nez)
DIURETIQUES	- Bumetanide (Burinex®) 1 - Furosemide (Lasix®) 2 - Hydrochlorothiazide+bisoprolol (Emcretic®, Lodoz®) 3 - Indapamide (Fludex®) 4	- Hypotension orthostatique 2 - Incontinence urinaire 1,2 - Déshydratation 2
VASODILATEURS CARDIAQUES	- Dinitrate d'isosorbide (Cedocard®) - Molsidomine (Coruno®, Corvaton®) - Nitroglycerine (Deponit®)	- Céphalées - Hypotension orthostatique - Vertiges
ANTIAGREGANTS PLAQUETTES	- Acide acétylsalicylique (Aspirine®, Asaflo®) - Clopidogrel (Plavix®)	- Hématomes - Sang dans les selles et les urines - Saignements anormaux ou abondants (exemple : nez) - Ulcère gastro-duodénal (peu fréquent)
ANTIARYTHMIQUES	- Amiodarone (Cordarone®) 1 - Sotalol (Sotalex®) 2	- Bradycardie 1,2 - Tremblements 1 - Hypotension 1,2 - Fatigue 2

INHIBITEURS DE LA POMPE A PROTONS (IPP)	Exemples de médicaments - Esomeprazole (Nexiam®) - Omeprazole (Losec®) - Pantoprazole (Pantomed®)	Effets indésirables fréquents - Diarrhées (y compris Clostridium)
--	--	--

ANTIBIOTIQUES BETA LACTAMES	Exemples de médicaments - Amoxicilline (Clamoxyl®) - Amoxicilline+Acide clavulanique (Augmentin®)	Effets indésirables fréquents - Diarrhées (y compris Clostridium) - Réactions allergiques (rares)
FLUOROQUINOLONE	- Ciprofloxacine (Ciproxine®)	- Diarrhées - Arthralgies et tendinites (peu fréquents)
NITROFURANES	- Nitrofurantoïne (Furadantine®)	- Diarrhées - Coloration brune des urines (sans danger)
ANTICHOLINERGIQUES ET MEDICAMENTS A PROPRIETES ANTICHOLINERGIQUES	- Butylhyoscine bromure (Buscopan®) - Oxybutinine (Ditropan®) - Amitriptyline (Redomex®) - Carbamazépine (Tegretol®) - Hydroxyzine (Atarax®)	- Constipation - Rétention urinaire - Bouche sèche - Sédation - Chutes - Vertiges - Confusion aiguë (delirium) - Hallucinations - Tachycardie
COLCHICINE	- Colchicine (opocalcium®)	- Diarrhées


NEUROLEPTIQUES	Exemples de médicaments - Haloperidol (Haldol®) 1 - Olanzapine (Zyprexa®) 2 - Quetiapine (Seroquel®) 3 - Risperidone (Risperdal®) 4	Effets indésirables fréquents - Sédation 1, 2, 3, 4 - Syndrome extrapyramidal (tremblements, rigidité et mouvements ralentis) 1, 2, 3, 4 - Hypotension orthostatique 1,2, 3,4 - Chutes 1, 2, 3, 4 - Prise de poids 2, 3, 4
ANTIDEPRESSEURS	- Amitriptyline (Redomex®) 1 - Escitalopram (Sipralax®) 2 - Duloxetine (Cymbalta®) 3 - Venlafaxine (Efexor®) 4 - Mirtazapine (Remergon®) 5	- Voir « DIVERS : anticholinergiques » 1 - Sédation 1,5 - Céphalées 2 - Chutes 1,2,3,4,5
BENZODIAZEPINES ET APPARENTES	- Alprazolam (Xanax®) - Bromazepam (Lexotan®) - Diazepam (Valium®) - Prazepam (Lysanxia®) - Zolpidem (Stilnoct®)	- Sédation - Confusion - Agitation paradoxale - Chutes
ANTIPARKINSONIENS	- Levodopa+benserazide (Prolopa®) 1 - Pramipexole (Sifrol®, Mirapexin®) 2 - Ropinirole (Requip®) 3	- Hypotension orthostatique 1,2,3 - Hallucinations 1,2,3 - Vomissements 1,2,3 - Chutes 1,2,3

AINS	- Diclofenac (Cataflam®) - Ibuprofène (Nurofen®) - Naproxène (Apranax®) - Piroxicam (Feldene®)	- Brûlures d'estomac - Affections cutanées - Céphalées - Vertiges - Hypertension artérielle - Grosses jambes - Dyspnée - Ulcère gastro-duodénal (peu fréquent) - Saignements digestifs (peu fréquents)
OPIACES	- Buprenorphine (Temgesic®, Transtec®) - Fentanyl (Durogesic®, Matrifen®) - Morphine - Oxycodone (OxyContin®, OxyNorm®) - Tilidine+Naloxone (Valtran®) - Tramadol (Contramal®)	- Sédation - Constipation - Vomissements - Hypotension
PUFFS (CORTICOSTEROIDES)	- Fluticasone (Flixotide®) - Budesonide (Pulmicort®)	- Mycoses buccales
ANTI-DIABETIQUES ORAUX	- Metformine (Glucophage®) - Glibenclamide (Daonil®) - Gliclazide (Uni Diamicron®) - Glimépiride (Amarylle®)	- Troubles gastro-intestinaux (vomissements, diarrhées) (surtout en début de traitement) - Hypoglycémie (confusion, altération de l'état de conscience/vigilance, perte de connaissance,...)
CALCIUM et FER	- Calcit® et Ferricure®	- Constipation
ALPHA 1 BLOQUANTS	- Tamsulosine (Omic®) - Térazosine (Hytrin®)	- Hypotension orthostatique

Divers

EFFETS SECONDAIRES OBSERVÉS

CLASSES MEDICAMENTEUSES ET MEDICAMENTS POUVANT ÊTRE IMPLIQUÉS



- 1 Chutes et vertiges
- 2 Confusion
- 3 Hallucinations
- 4 Sédation et somnolence

Anticholinergiques 1, 2, 3, 4

Antidépresseurs 1, 2, 4

Benzodiazépines 1, 2, 4

Neuroleptiques 1, 4

Opiacés 4

Antiparkinsoniens 1, 3

Butylhyoscine bromure (Buscopan®),
Oxybutinine (Ditropan®), Hydroxyzine (Atarax®)

Amitriptyline (Redomex®) 1-2-4, Mirtazapine (Remergon®) 1-4,
Escitalopram (Sipralaxa®) 1

Prazepam (Lysanxia®), Diazepam (Valium®), Alprazolam (Xanax®),
Bromazepam (Lexotan®)

Quetiapine (Seroquel®), Risperidone (Risperdal®), Olanzapine (Zyprexa®)

Tilidine+naloxone (Valtran®), Buprenorphine (Transtec®), Tramadol (Contramal®),
Oxycodone (OxyContin®, OxyNorm®), Morphine (MS contin®)

Pramipexole (Mirapexin®), Ropinirole (Requip®)

Hypotension

Antagonistes calciques
Antiarythmiques
Beta bloquants
IECA
Opiacés

Amlodipine (Amlor®), Vérapamil (Isoptine®)
Amiodarone (Cordarone®), Sotalol (Sotalax®)
Nebivolol (Nobiten®)
Lisinopril (Zestril®)
Tramadol (Contramal®), Oxycodone (OxyContin®)

Hypotension orthostatique

Alpha-1 bloquants
Antiparkinsoniens
Diurétiques
Neuroleptiques
Vasodilatateurs cardiaques

Tamsulosine (Omic®)
Levodopa + Benserazide (Prolopa®)
Furosémide (Lasix®)
Halopéridol (Haldol®)
Dinitrate d'isosorbide (Cedocard®)

Saignements

Anti vitamine K
Héparine de bas poids moléculaire
Anticoagulants oraux directs
Antiagrégants plaquettaires
AINS

Acenocoumarol (Sintrom®), Phenprocoumon (Marcoumar®)
Enoxaparine (Clexane®), Nadroparine (Fraxiparine®), Tinzaparine (Innohep®)
Dabigatran (Pradaxa®), Apixaban (Eliquis®), Rivaroxaban (Xarelto®)
Acide acétylsalicylique (Asaflow®), Clopidogrel (Plavix®)
Piroxicam (Feldene®), Naproxene (Apranax®)

Constipation

Anticholinergiques
Calcium et Fer
Opiacés
Vérapamil
Diltiazem

Butylhyoscine bromure (Buscopan®), Oxybutinine (Ditropan®)
Cacit®, Steocar®, Ferricure®, Venofer®
Tramadol (Contramal®), Oxycodone (OxyContin®)
Vérapamil (Isoptine®)
Diltiazem (Tildiem®)

Diarrhées

Antibiotiques (tous)
Colchicine
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)
Metformine

Beta lactames (Augmentin®), Fluoroquinolones (Ciproxine®), Nitrofuranes (Furadantine®)
Colchicine Opocalcium®
Esomeprazole (Nexiam®), Pantoprazole (Pantomed®)
Metformine (Glucophage®)

Ulcère gastro-duodéal (peu fréquent)

AINS
Antiagrégants plaquettaires

Ibuprofen (Nurofen®), Naproxene (Apranax®), Diclofenac (Cataflam®)
Acide acétylsalicylique (Asaflow®), Clopidogrel (Plavix®)

Vomissements et nausées

Opiacés
Antiparkinsonien
Metformine

Tramadol (Contramal®), Oxycodone (OxyContin®)
Pramipexole (Mirapexin®), Ropinirole (Requip®)
Metformine (Glucophage®)

Divers

Bouche sèche
Douleurs musculaires
Incontinence urinaire
Rétention urinaire

Anticholinergiques
Statines
Diurétiques
Anticholinergiques

Butylhyoscine bromure (Buscopan®), Oxybutinine (Ditropan®), Amitriptyline (Redomex®)
Atorvastatine (Lipitor®), Pravastatine (Pravastatine®), Simvastatine (Zocor®)
Furosémide (Lasix®), Bumetanide (Burinex®)
Butylhyoscine bromure (Buscopan®), Oxybutinine (Ditropan®), Amitriptyline (Redomex®)

Références :

- Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique (CBIP)
- Formulaire MRS 2014
- Pubmed
- Le guide Prescrire

Cet outil a été développé dans le cadre de l'étude COME-ON
Dernière mise à jour : Août 2015

Nous ne citons que les classes de médicaments et médicaments les plus souvent impliqués