

Tableau reprenant les médicaments de chimio. les plus couramment utilisés et leur principaux effets secondaires :

Nom du produit	Indications les plus courantes (premier et second choix confondus)	Toxicité spécifiques	Hémato-toxicité	Nausée, vomissement	alopécie
Bléomycine, Bléomycine®	Lymphome, testicule	F°, fibrose pulm., cutéano- muqueuse	±	+	+
Carboplatine Paraplatine®	± idem cisplatine,		+++ (surtout thrombopénie)	+++	±
Cisplatine® Platinol	Poumon, ovaire, testicule, ORL, vessie, estomac, œsophage, col, utérus,	Néphrotoxique, ototoxique, neurologique	+++	+++	±
CPT 11, Campto® Irinotecan	Colon (α)	Diarrhée aiguë et retardée (après 1 sem)	+++	+++	Doseddépendante
Cyclophosphamide Endoxan®	Sein, endomètre, lymphomes-non hodgkinien	Cystite hémorragique à haute doses	+++	++	±
Docétaxel, Taxotere®	Sein (α), poumon (α), ORL, estomac	Polyneuropathie, cutanée, unguéale	+++	+	+++
Adriablastine®, Doxorubicine, Adriamycine	Sein, sarcome, lymphomes	Cardiaque, ↓ contractilité	+++	+++	+++
Epirubicine, Farmorubicine®	Sein, lymphome, Poumon à pt cellules, vessie, estomac	Cardiaque	+++	+++	+++
Etoposide, VP 16, Vépeside®	Poumon à pt. Cellules, ovaires, testicule.		+++	++	+++
Fluoro-uracile, 5-Fu	Colon, sein, pancréas, estomac	Syndrome pied-main(γ), aphtes	+	±	±
Gemcitabine, Gearsar®	Poumon non à pt. Cellules(α), vessie (α), pancréas (α)		+++	+	±
Ifosfamide, Holoxan®	Sarcome, col utérin, ovaire, testicule, poumon non à pt cellules	Confusion, cystite hémorragique	+++	+++	+++
Navelbine	Sein(α), Poumon(α)		+++	±	±
Méthotrexate, Lédertrexate®	Sein, vessie, ORL, estomac, carcinomatose méningée en intrathécal	Aphtes	++	++	+
Mitoxantrone, Novantrone®	Sein, lymphome,	Cardiaque	+++	++	++
Oxaliplatine, Eloxatin	Colon (α)	Polyneuropathie au froid	+++	+++	+
Paclitaxel, Taxol®	Sein(α) , ovaire(α)	Polyneuropathie, arthralgie, myalgie	+++	+	+++
Vinblastine, Velbé®	Testicule, lymphome, vessie, rein	Polyneuropathie, iléus paralyticus	+++	+	±
Vincristine, Oncovin®	Lymphome,	Polyneuropathie, iléus paralyticus	+	+	+
Vinorelbine, Navelbine®	Poumon(α), sein(α)		+++	+	±

(α) : indication remboursée en Belgique, avec accord du médecin conseil, sous certaines conditions, ces médicaments sont toutefois actifs sur d'autres types de tumeurs

(β) : procédure de remboursement en cours

(γ): érythème, douleur et parfois épidermolyse de la plante des mains et pieds