



par les Drs Laurence DERYCKER, Thomas ORBAN
et Thierry VAN DER SCHUEREN

Médecins généralistes

rmg@ssmg.be

Le dépistage systématique de l'hépatite C est-il justifié ?

Les nouveaux traitements contre l'hépatite virale C semblent prometteurs. Toutefois, nous ne disposons pas encore du recul suffisant pour en évaluer l'efficacité clinique réelle (guérison potentielle) ainsi que la balance bénéfices/risques à long terme. De plus, seule une minorité de patients atteints d'une hépatite C chronique développera une cirrhose terminale. Etant donné qu'actuellement il n'est pas possible d'identifier les patients susceptibles de développer une cirrhose terminale, il n'est pas possible d'identifier ceux qui bénéficieraient le plus des effets de ce type de traitements. Il n'est donc pas utile d'étendre le dépistage de l'hépatite C à l'ensemble de la population. Les recommandations des organisations gouvernementales telles que le CDC (Center for Disease Control and prevention) qui préconisent un dépistage ciblé restent donc d'actualité. (TVdS)

Koretz R Lin K, Ionnidis J, Lenzer J. Is widespread screening for hepatitis C justified? *BMJ* 2015; 350 : g7809.
Lien : <http://www.bmj.com/content/350/bmj.g7809>

Mots-clés : dépistage, hépatite C.