



TRICHOMONAS VAGINALIS

Auteur : Dr Chloé Aujoulat

Dernière mise à jour : 05/2023

Traitement	<p>Traiter systématiquement si suspicion clinique et/ou résultats positifs. Préférez le traitement systémique au local vu la fréquente propagation de Trichomonas Vaginalis dans l'urètre et les glandes de Bartholin.</p> <p>Le traitement unique a un taux d'échec plus élevé mais est plus efficient (l'adhérence au traitement est plus élevée).</p> <ul style="list-style-type: none">– Métronidazole 500 mg oral 2X/j pdt 7 j à privilégier chez la femme– Métronidazole 2 g, dose unique– Tinidazole 2 g, dose unique (indisponible en Belgique depuis 09/2021) <p>Allergie :</p> <ul style="list-style-type: none">– Référer pour une désensibilisation au Métronidazole à privilégier chez la femme <p>La résistance au Métronidazole est rare et cède généralement à des doses plus élevées ou au Tinidazole.</p> <p>Si échec, après avoir exclu non-adhérence et réinfection :</p> <ul style="list-style-type: none">– Métronidazole 500 mg 2x/j pdt 7j si d'abord traité en dose unique– Métronidazole (ou Tinidazole) 2 g 2 X/j pendant 5 à 7 j– Tinidazole 1 g 3 X/j ou 2g 2X/j pendant 14 j +/- Tinidazole 500 mg intra- vaginal 2 X/j pendant 14 j– Métronidazole i.v. <p>L'alcool doit être proscrit durant la prise du traitement jusqu'à 24 h après l'arrêt du Métronidazole, et 72 h après l'arrêt du Tinidazole.</p>
Suivi	<ul style="list-style-type: none">– Contrôle si persistance des symptômes, répéter la PCR au plus tôt 3 semaines après la fin du traitement.– Certains guides de bonne pratique recommandent de re-tester à 3 mois les femmes.– Si persistance des symptômes ou récurrences malgré traitement : vérifier l'adhérence au traitement, exclure une ré-infection par un nouveau partenaire,– Rechercher VIH, Chlamydia, Syphilis, Gonorrhée, VHB, VHC.
Partenaire	<ul style="list-style-type: none">– Traiter d'office les partenaires sexuels en contact avec le patient infecté lors des 4 semaines précédant l'apparition des symptômes,– Traiter par le même schéma et simultanément,– Les rapports sexuels doivent être évités durant 1 semaine après début du traitement et jusqu'à résolution des symptômes.

Source :

Jack D Sobel. Trichomoniasis : treatment. In : UpToDate, Robert L Barbieri (Ed). (Accessed on March 30, 2023)