


FROTTIS PCR SI RSNP



si pénétration
vaginale



» Frottis vaginal

(auto)-frottis au fond du vagin, tourner pendant 10 secondes.

si pénétration
anale



» Frottis anal

Insérer le prélèvement à 2 cm de profondeur et tourner pendant 10 secondes.

si fellation



» Frottis oral

Frotter pendant 10 secondes au niveau des amygdales, des joues internes et des gencives.

MST sur Frottis

- C. trachomatis M. genitalium
 N. gonorrhoeae T. Vaginalis

IST recherchées:

» Chlamydia

» Gonocoque

» Mycoplasme

» Trichomonas

Chercher un M. genitalius au niveau vaginal peut avoir de l'intérêt. Au niveau oral et au niveau anal, sa recherche reste très controversée, cependant certains laboratoires peuvent vous envoyer un résultat positif même si vous ne l'avez pas coché !

Avec le soutien de:

E.R.: Quentin Mery + SSMG asbl rue de Suisse 8 - 1060 Bruxelles - 0410.639.602

PRISE DE SANG CHEZ ♀ ET ♂



Tube sec (bouchon rouge)

SEROLOGIE VIRALE

- Ag HBS
- Ac HBS
- Ac HBc totaux
- Ag HBe
- Ac HBe
- Ac hép. A tot.
- IgM
- Ac hépatite C
- EBV IgG
- IgM
- Rubéole IgG
- IgM
- CMV IgG
- IgM
- Parvo IgG
- Parvo IgM
- Oreillon IgG
- IgM
- Varicelle-Zona (IgG - IgM)
- HIV 1 et 2 (Ag + Ac)

SEROLOGIE BACTERIENNE

- Syphilis
- VDRL
- Brucellose
- Borréliose (Lyme)
- Helic. pylori-IgA,IgG,IgM
- Chlamydia trachomatis
- Chlamydia pneumoniae
- Mycop.pneumon. IgA,IgM
- Bartonella henselae
- Bordetella pertussis

Réactions	Interprétations
TPHA- VDRL-	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de tréponématose • Syphilis en incubation • Syphilis primaire dans les 5 à 10 premiers jours du chancre
TPHA- VDRL++ à +++	Faux positif probable
TPHA+ VDRL- (ou titre faible d'anticorps)	<ul style="list-style-type: none"> • Séquelle sérologique d'une tréponématose non vénérienne • Syphilis a priori guérie • Syphilis tertiaire • Syphilis primaire dans les 10 à 15 premiers jours du chancre
TPHA+ VDRL+ à +++ (ou titre élevé d'anticorps)	Tréponématose non vénérienne (zone d'endémie) ou vénérienne
Commentaire: devant toute situation douteuse, il est recommandé de reconrôler les tests après quatre semaines. TPHA: treponemal pallidium haemagglutination assav. VDRL: venereal disease research laboratory	

IST recherchées:

› Hépatite B

› Hépatite C si profil à risque:

HSH, usager de drogue, rapports avec saignement, ...

› Hiv

› Syphilis (les résultats et leur interprétation dépendent de la technique utilisée par le laboratoire)

Avec le soutien de:

ANALYSE D'URINE PAR PCR CHEZ ♂

Attention
Urine 1^{er} jet
minimum 1H sans uriner



MST urinaire (PCR) ♂

C. trachomatis

N. gonorrhoeae

M. genitalium :

- à tester uniquement chez les patients symptomatiques qui présentent un résultat négatif pour Chlamydia et Gonocoque
- un résultat positif pour M. genitalium ne nécessite pas de traitement

Trichomonas Vaginalis

IST recherchées:

› Chlamydia

› Gonocoque

› Mycoplasme

› Trichomonas (selon votre laboratoire, il peut vous faire parvenir un résultat positif même si vous ne l'avez pas coché)

Avec le soutien de:

E.R.: Quentin Mary + SSMG asbl rue de Suisse 8 - 1060 Bruxelles - 0410.639.602